


Podnebje




- Primerjaj oba klimograma.
- V katerem letnem času je največ padavin?
- Kakšna je temperatura pozimi in kakšna poleti?

- Podnebje v panonskem svetu je zmerno celinsko.
- Zanj je značilno: mrzle zime, vroča poletja, višek padavin je poleti (nevarnost neviht s točo).
- Značilen je **temperaturni obrat - inverzija** (v zimskem času).
- Inverzija je pojav, ko se na dnu kotlin zadržuje hladen zrak, v višjih legah pa je zrak toplejši.

© Modrijan založba, d. o. o.



Temperaturni obrat.



Rastlinstvo

- Gozdovi so v ravninah skrčeni.
- Na osojnih pobočjih in višjih vzpetinah je pogosto gozd.
- Prevladuje listnati gozd.
- Krakovski gozd. U 78

Vodnatost

- Največji reki sta Drava in Mura.
- HE na Dravi.
- Mrtvice. Rečni rokavi, spremenjeni v jezera ali močvirja, kjer se je ohranil edinstven živalski in rastlinski svet.
- Plavajoči mlini na Muri.



Pri Petišovcih je ohranjeno največ mrtvic
ob reki Muri.

Mrtvice so značilne za nižinske reke.



Nastanek mrtvega rokava

© Modrijan založba, d. o. o.



Mrtvica nastane iz okljuka matične struge ali stranskega rokava. Tok reke izpodjeda zunanje bregove okljukov. To povzroča večanje okljuka ter zблиževanje začetka in konca okljuka. Sčasoma tok reke izdolbe novo strugo po krajši poti. Začetek in konec okljuka se počasi zasipata z materialom, tako da ostane okljuk brez stika s tekočo vodo - mrtvica. Mrtvica nastane tudi iz stranskega rokava, kadar se prekine trajna povezava stranskega rokava z matično strugo.

Mrtvice reke Mure so kljub svojemu imenu polne življenja in so pravi raj za številne živalske in rastlinske vrste.



Plavček ali barjanska žaba – najmanjša prava žaba v Sloveniji.

Ob mrtvicah Mure jih najdemo več kot 30 vrst. Kačji pastir – zelena deva.



V Sloveniji raste le v mrtvicah v Prekmurju. Praprot.